



What is a Rapid Antigen Test?

- This is an easy-to-use test that looks for evidence of the COVID-19 virus.
- Results are available in 15 minutes and **do not** need to be confirmed by a PCR test.
- Rapid Antigen Tests can be used at home.
For information, please refer to the following:
 - instructions provided inside the test.
 - [video](https://www.youtube.com/watch?v=CBBd4JRWtsg) on how to use rapid antigen tests <https://www.youtube.com/watch?v=CBBd4JRWtsg>

Who Should Use a Rapid Antigen Screening Test?

- Rapid antigen tests can be used by people experiencing COVID-19 symptoms including one of:
 - fever and/or chills;
 - cough;
 - shortness of breath;
 - decrease or loss of taste or smell; OR
 - **Two or more of:**
 - runny nose/nasal congestion
 - headache
 - extreme fatigue
 - sore throat
 - muscle aches/joint pain
 - gastrointestinal symptoms (i.e. vomiting or diarrhea)
- While one-off testing (e.g. before a social gathering) by people not experiencing COVID-19 symptoms and without a known exposure is generally not recommended, if you choose to use a rapid antigen test in this way complete it as close to the event as possible (e.g. ideally within a few hours of the event) and know that a negative result could be a false negative.
- Close contacts should self-isolate in accordance with guidance.

What Does My Test Result Mean?

Positive Rapid Antigen Test Result

- It is highly likely that you have COVID-19.
- Self-isolate immediately:
- For at least 5 days (if fully vaccinated or under 12 years old) or 10 days (if not fully vaccinated or immunocompromised) from when your symptoms started and until you have no fever and symptoms have been improving for 24 hours (or 48 hours if gastrointestinal symptoms), whichever is longer.
- If you live, work, attend, or volunteer in a highest risk setting¹, let them know that you had a positive result and follow the direction you are given.
- Household members (including anyone fully vaccinated) must self-isolate while you are self-isolating.
- Notify people that you have come into **close** contact with starting 48 hours before your symptoms developed and until you began to self-isolate.
- If you are concerned about your symptoms, contact your health care provider or Telehealth (1-866-797-0000).

Negative Rapid Antigen Test Result

- If you have COVID-19 symptoms, and your test is negative, you may still have COVID-19.
- Use another rapid antigen test 24-48 hours after your first negative test. If it is negative you most likely do not have COVID-19. Self-isolate until your symptoms are improving for at least 24 hours (or 48 hours if gastrointestinal symptoms).

¹ Highest risk settings include hospitals (including complex continuing care facilities and paramedic services) and congregate living settings, including Long-Term Care, retirement homes, First Nation elder care lodges, group homes, shelters, hospices and correctional institutions.

To learn more about public access to rapid antigen tests, visit ontario.ca/rapidtest



Qu'est-ce qu'un test antigénique rapide?

- C'est un test facile à utiliser qui recherche des traces du virus de la COVID-19.
- Les résultats sont prêts en un quart d'heure et **n'ont pas besoin** d'être confirmés par un test PCR.
- Les tests antigéniques rapides peuvent être utilisés chez soi. Pour en savoir plus, veuillez consulter :
 - le mode d'emploi fourni dans la trousse
 - la [vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=2AOKih7wnlg) sur l'utilisation des tests antigéniques rapides <https://www.youtube.com/watch?v=2AOKih7wnlg>

À qui les tests antigéniques rapides sont-ils destinés?

- Les tests antigéniques rapides peuvent être utilisés par les personnes présentant des symptômes de la COVID-19, notamment :
 - fièvre ou frissons
 - toux
 - essoufflement
 - diminution ou perte de l'odorat ou du goût
 - **deux ou plus des symptômes suivants** :
 - nez qui coule/congestion nasale
 - mal de tête
 - fatigue extrême
 - mal de gorge
 - courbatures/douleurs articulaires
 - symptômes gastro-intestinaux (vomissements ou diarrhée)
- Les tests ponctuels (avant de se réunir avec des amis, par exemple) ne sont pas généralement recommandés pour les personnes ne présentant aucun symptôme de la COVID-19 et n'ayant pas d'exposition connue au virus. Cependant, si vous décidez d'utiliser un test rapide de cette façon, faites-le aussi près de la date que possible (idéalement quelques heures avant) et sachez qu'un résultat négatif peut être un faux résultat.
- Les personnes en contact étroit avec une personne malade doivent s'isoler conformément aux directives.

Comment interpréter les résultats

Résultat de test antigénique rapide positif

- Il est fort probable que vous ayez contracté la COVID-19.
- Isolez-vous immédiatement pendant au moins 5 jours (si pleinement vacciné/e ou moins de 12 ans) ou 10 jours (si pas pleinement vacciné/e ou immunodéprimé/e) à partir du moment où vos symptômes sont apparus et jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fièvre et que vos symptômes s'atténuent depuis 24 heures (ou 48 heures en cas de symptômes gastro-intestinaux), selon la durée la plus longue.
- Si vous vivez, travaillez, faites du bénévolat ou vous rendez dans un milieu à plus haut risque¹, dites-leur que vous avez eu un résultat positif et suivez les instructions qu'on vous donne.
- Les membres de votre ménage doivent s'isoler pendant que vous vous isolez (y compris toute personne pleinement vaccinée).
- Informez les personnes avec lesquelles vous avez été en contact **étroit** pendant les 48 heures avant l'apparition de vos symptômes et jusqu'à ce que vous commenciez à vous isoler de votre résultat positif.
- Si vos symptômes vous inquiètent, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou Télésanté (1 866 797-0000).

Résultat de test antigénique rapide négatif

- Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, il se peut que vous ayez la COVID-19 malgré un résultat de test négatif.
- Faites un autre test antigénique rapide dans les 24 à 48 heures après votre premier test négatif. Si les résultats de ce test sont aussi négatifs, vous n'avez probablement pas la COVID-19. Cependant, isolez-vous jusqu'à ce que vos symptômes s'atténuent depuis au moins 24 heures (ou 48 heures en cas de symptômes gastro-intestinaux).

¹ Les milieux à plus haut risque comprennent les hôpitaux (y compris les établissements de soins continus complexes et les services paramédicaux) et les logements collectifs, y compris les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées des Premières Nations, les foyers de groupe, les refuges, les hospices et les établissements correctionnels.

Pour en savoir plus sur l'accès aux tests antigéniques rapides pour le public, veuillez consulter ontario.ca/testrapide

REVENTE INTERDITE